# 【口腔外科認定医による】親知らず抜歯治療のご説明・同意書

親知らず（智歯）は歯肉や骨の中に埋まって、彎曲や肥大など歯根の異常をともなっていることが多く、抜歯が困難なため専門的な術式が必要です。当院では手術は慎重に行いますが、それでも術後に著しい痛みや腫れなどの不快症状を生じることがあり注意が必要です。

親知らず抜歯の必要性について


- 親知らずが傾斜したり、骨に埋まっている
- 手前の歯(第二大臼歯)との間に食片が入りムシ歯や歯周炎の原因になっている。または、なる可能性があり、親知らずを抜歯しないでいるとムシ歯が進行して第二大臼歯も将来抜歯になる可能性がある。
- 親知らずのまわりに汚れがたまり、歯肉に炎症を起こしている。
- 親知らずのまわりに膿の袋ができて骨を吸収している。
- 歯列不正の原因になっている。または、将来的に原因になる可能性がある。

手術について

- 手術時間は 40～60 分間です。手術中の状況により術式が変更になることがあります。
  術後に鎮痛剤と抗菌剤の薬を処方します。
- 歯根と顎の神経の位置関係を詳しく見るため、必要に応じて CT 検査を行います。
- 当院は厚生労働省研究指導施設のため、歯科医師および学生が手術、X 線撮影、外来の処置を見学する場合がございます。また、手術の内容によっては担当歯科医師および支援のための歯科医師がつく場合があります。
- 手術や処置中に写真またはビデオ撮影を行い、教育・研究・専門医申請・学会発表・その他患者啓蒙用資料等に使用することがあります。その際、個人情報の管理は十分に行い、個人情報が特定されることはありません。

抜歯の術式(手順)

①麻酔 ➔ ②切開する ➔ ③骨を削除する ➔ ④歯を分割する ➔ ⑤抜歯 ➔ ⑥縫合する



抜歯後の合併症

（1）下顎の抜歯等における神経障害（特に親知らずの抜歯）

下顎の抜歯では下歯槽神経・舌神経という神経の近くを処置します。抜歯の際に加わる刺激が原因で下唇周囲や歯肉周囲のしびれ・マヒ（0.3～0.6%程度）、舌のしびれ・マヒ・味覚障害（0.1～0.2%程度）が生じる可能性があります。神経障害の多くは一時的なもので徐々に回復しますが、長期的または永続的に症状が残る可能性もあります。
神経障害に対して当院では薬物療法を行います。必要に応じて専門施設の紹介を行います（治療費は自己負担）。

（2）上顎の抜歯等における上顎洞の穿孔および上顎洞内への歯の迷入（特に親知らずの抜歯）

上顎の奥歯の近くには上顎洞という鼻と交通する空洞があります。上顎洞に穴が開いて鼻症状（鼻炎、鼻声、鼻から水が漏れるなど）が生じることがあります。多くは自然に改善しますが、穴が大きい湯合は閉鎖術を行うこともあります。
まれに歯や治療器具が上顎洞内に入り込むことがあります（異物迷入）。歯肉を切開して摘出することもあります。

（3）その他、外科処置に対する一般的な症状について

出血　通常、手術当日～翌日は創部から少量出血します。出血量が多い場合、再受診して止血処置を行いますが、当院が閉院時には救急病院等を受診していただく場合があります。持病やお薬の影響で出血が数日続く場合があります。

術後感染　細菌感染が生じることがあります。抗菌薬を内服しても感染したり、時間が経ってから感染することもあります。

痛み・腫れ　1～2 週間程度は痛みや腫れが続きます（最も症状が強いのが術後２～３日）。
多くは鎮痛剤で抑えられますが、痛みの程度や期間には個人差があります。まれに処置をした部位の骨が露出して、強い痛みが数週間続くことがあります（ドライソケット）。腫れた部位がしこりのようになることがありますが、２ヶ月程度の時間をかけて徐々に改善していきます（硬結）。
創部を中心とした発赤・麻痺感、口内炎および開口障害が出現することがありますが、1 週間程度で消えます。

ショック症状　緊張や恐怖等によって、血圧低下・吐き気・眩暈等のショック症状を起こすことがあります。

アレルギー・過敏症　使用する薬剤、治療器具、医療材料に対して、アレルギーや過敏症を生じることがあります。医療材料にはウシなどの動物由来の製品もありますが、これらの材料の使用を拒否する場合は担当医にお伝えください。

顎関節症状　開口時に顎が外れることがあります（顎関節脱臼）。その場で戻しますが多少痛みが出る場合があります。

皮膚症状　内出血により皮膚が紫色になることがありますが、その後は黄色に変色していき、通常 2～4 週間で消えます。
器具が接触したリロ角を牽引することで、口腔粘膜（舌、歯肉、頬部、口角、唇）や周囲の皮膚に損傷（アザ・発赤・やけど・擦り傷・切り傷・腫れ・浮腫）が生じる湯合があります。

気腫　ごくまれに手術部位から空気が入り込み、顔から首にかけて大きく腫れることがあります（気腫）。抗菌薬を処方し数日間の経過観察を行いますが、専門医療施設に検査・治療を依頼する場合があります。

影響　周囲の歯に影響がでる場合があります（破折・抜ける・咬んだ時の痛み・しみる・揺れる・被せ物等の脱離）。

誤飲　歯・治療器具・被せ物や詰め物を飲み込んでしまうことがあります（誤飲）。多くの場合は便と一緒に排出されますが、飲み込んだ物の大きさや形状によっては、専門医療施設に検査や嫡出を依頼する場合があります。

破折　歯根など歯の一部が破折する場合があります。摘出が困難な場合は、安全を優先して、摘出せずに保存します。まれに破片が原因で感染症が生じることがありますが、多くは特に症状がなく骨と一体化します。上顎洞内や骨の外側に破片が入リ込んだ場合は、専門医療施設に全身麻酔での摘出術を依頼する場合があります。

骨が癒着、薄い　歯と骨が癒着していたり、骨が薄い場合には、骨の一部が歯と一緒に取れたり、骨折する場合があります。骨の出っ張りが強い場合には骨の形態を整える処置をします。専門施設に骨折部位の固定を依頼する場合があります。

麻酔　体質や歯の状態により麻酔が効きにくい場合は、処置を中断して後日に治療を行うか、専門医療施設に治療を依頼します。

金属片の残存　治療器具や被せ物等の金属片が創部に残存する可能性があります。金属片の大きさによっては無理に摘出せず経過観察する場合があります。金属片が小さい場合は、後日撮影のレントゲンで偶然見つかる可能性があります。必要に応じて、摘出処置を後日行う場合があります。

再発・悪化　嚢胞や腫瘍を摘出した際、病気の種類によっては再発したり、症状が悪化する可能性もあります。

抜歯後当日の注意事項

- 抜歯後は、ガーゼか脱脂綿を強く咬んでいるように言われます。これは、傷痕を圧迫して血を止めるためですから、10〜20 分間、強く咬んでいてください。溶けた血が唾液に混じった状態が数時間は続きますが、気にしすぎて頻繁に唾を吐くと、かえって出血の原因となります。
- 抜歯当日は、なるべくうがいはしません。うがいによって固まった血がはがれたり、流されたりすると、止血しません。また、一度止まってから再度出血することがあります。
- 抜歯後の痛みは、抜歯する部位、歯の状態、病巣の様子などによって違いますが、2〜3 時間で治まるのが普通です。痛みが強いときは、我慢せずに歯科医がくれた鎮痛剤を飲んでください。鎮痛剤のために治りが遅くなるということはありません。
- 抜歯後、すぐに激しい痛みや腫れ、出血が起こったときは、炎症の再燃や急性化が疑われますので、歯科医に至急相談してください。
- 麻酔によるしびれが取れたら（2〜3 時間から数時間）、食事をとることができます。
- 抜歯当日は、過激な運動、入浴、飲酒などを控えてください。末梢血管が拡張して、再度出血するおそれがあります。また、腫れや痛みが強くなることもあります。

✓ 上記の説明を受け、十分に内容を理解したので、治療を受けることに同意いたします。

✓ 上記の説明を受け、以下の医療機関にて治療することに同意いたします。

□ 新百合ファーストデンタル
□ 梶が谷ファースト歯科
□ 青葉台ファースト歯科

ご自宅住所

電話番号

記入日　　年　　月　　日

氏名（自著）

＊未成年の場合　保護者氏名：　患者との関係：

安全のため、以下の疾患・お体の状態・治療につきまして、過去のものも含めて該当する項目の□に✓をお願いいたします。

□ **該当なし**

□ 高血圧　□ 骨粗しょう症　□ 糖尿病　□ 心臓疾患・不整脈・脳血管障害　□ 血液疾患

□ 悪性腫瘍（がん）□ リウマチ　□ 人工透析　□ 抗凝固薬・抗血栓薬の内服

□ ステロイド薬の内服　□ アレルギー（抗生剤、痛み止め）

# キャンセル・ご予約の変更について

下記診療のご予約をキャンセル、および日程変更される場合は、原則としてキャンセル料が発生いたします。キャンセル料つきましては、以下の通りになります。

【ご予約のキャンセル・ご変更】
・ご予約日４日前まで　　キャンセル料は発生いたしません
・ご予約日３日前から　　キャンセル料が発生いたします

【ご予約内容】
□　親知らず抜歯　　キャンセル料　￥〇〇

今回キャンセル料が発生するのは

＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日　以降となります

当院はすべての患者様への丁寧で高度な治療の提供を目指しており、綿密な治療計画を組み、患者様の歯の治療にあたっております。
キャンセルをしてしまうとご自身の治療計画だけではなく、他の患者様の治療時間に影響が出てしまうことがあります。
なるべく多くの患者様にスムーズなご予約、ご案内ができますようキャンセル・日程変更の際は、お早めにご連絡いただけますようご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

医療法人社団ファイブエス